ESTABILIDADE DE ENZIMAS

Estabilidade Enzimática X Atividade Enzimática

- **Atividade Enzimática:** É dada pela medição da velocidade inicial da reação sob uma faixa de condições determinadas.
- **Estabilidade Enzimática:** Capacidade das enzimas de reter sua capacidade catalítica sob diferentes condições de reação ao longo do tempo – função biológica das enzimas esta intimamente associada à sua estrutura tridimensional.

Atividade Enzimática

Velocidade inicial da reação é determinada pela faixa linear da formação de produto.

Estabilidade das Enzimas

Desnaturado

Nativo

Estado termodinamicamente mais estável em condições fisiológicas

Os estados de equilíbrio da desnaturação das proteínas consistem na alteração das propriedades físico químicas da solução de modo a deslocar o equilíbrio – valor da constante de equilíbrio.

Fatores que Influenciam a Estabilidade

- Temperatura
- pH
- Força iônica
- Presença de agentes desnaturantes
- Atividade da água
- Pressão

Efeito da Temperatura

Desnaturação por desdobraimento da Molécula- liberdade conformacional aumenta a elevadas temperaturas – reversível na zona de transição

Desnaturado

Nativo

Efeito do pH

- Normalmente valores extremos de pH induzem a desnaturação (muito ↑ ou muito ↓).
- Alteração da carga dos aminoácidos da molécula (anula interações eletrostáticas- promove repulsões)- 7 dos 20 aas das proteínas alteram sua carga com variação do pH
- Afeta a estrutura da molécula.

Efeito do pH

- Desnaturação ácida (pH ↓) desaparecimento das cargas negativas (grupos COOH das Asp e Glu).
- Desnaturação alcalina (pH ↑): desaparecimento das carga positivas- acúmulo negativas grupos COOH e nas tirosinas e cisteínas.

Estrutura interna de uma proteína- irreversível aumenta reatividade

Efeito do pH

Agentes Desnaturantes

- Substâncias que causam a desnaturação das enzimas- aumentam solubilidade cadeias laterais da proteína (hidrófobas e polipeptídica)
- Na maioria das vezes é reversível (100%).
- Utilizados p/ caracterização termodinâmica da desnaturação.

Ex: cloreto de guanidina e uréia

Atividade da Água

- O nível e distribuição de água residual afeta a eficiência catalítica.
- Falta de água torna a molécula mais rígida e excesso de água diminuí estabilidade enzimática ($a_w < 1$ - causa rigidez)

Desnaturação Irreversível

Modo de quantificar inativação irreversível – medir a atividade enzimática inversamente proporcional ao número de moléculas irreversivelmente desnaturadas

Desnaturação Irreversível

Alterações Covalentes

- Quebra das ligações peptídicas: contaminação c/ proteases, pH ácido ou alcalino
- Desamidação dos resíduos de asparagina e glutamina (introduz cargas negativas no interior da molécula conduzindo a perda da atividade)

Alterações Não Covalentes

- Agregação (interações hidrófobas minimiza contato com a água externa -pelos aas hidrófobos expostos na superfície, que se agregam)

Desnaturação Irreversível

- Inativação pode seguir cinética de 1ª ordem, exceto enzimas imobilizadas.

$$- \frac{dE}{dt} = k_d E$$

Integrando

$$\frac{E}{E_0} = e^{-k_d t}$$

Taxa de perda de atividade

E = atividade enzima, t = tempo,

K_d = constante de desativação

E₀ = atividade no tempo zero

E = atividade no tempo t

k = constante de desativação

Efeito da Temperatura - Desnaturação

Ex. Decaimento da cutinase a pH 9,2 em diferentes Temperaturas – pode-se calcular K_d para cada Temperatura
K_d maior com aumento de T

Meia-vida

$$t_{1/2} = \frac{\ln 0,5}{-K_d}$$

$$E/E_0 = 0,5$$

Tempo de meia vida – tempo ao fim do qual a enzima perde 50% da atividade

Efeito da Temperatura - Desnaturação

IMOBILIZAÇÃO:

- Tende a aumentar a estabilidade das enzimas.

Enzimas Termoestáveis

- Resistentes a desnaturação térmica
- Demanda industrial (mercado ~US\$ 250 milhões)
- Processos mais drásticos
- Organismos termofílicos

Efeito da Pressão

- O efeito da pressão em um processo físico-químico em equilíbrio é governado por uma mudança de volume no processo (ΔV).
- A aplicação de pressão faz com que o equilíbrio se desloque em favor do lado da reação com menor volume.

$$\left(\frac{d \ln K}{dP}\right)_T = -\left(\frac{\Delta V}{RT}\right)$$

Efeito da Pressão

Interações Intramoleculares

- **Interações iônicas:** Proteínas formam pares iônicos que estabilizam sua estrutura terciária e quaternária. A pressão leva ao seu rompimento.
- **Hidratação:** Deformação da proteína pela entrada de água dentro da molécula.
- **Ligações de hidrogênio:** Promove as ligações de H, acarretando em conformações flutuantes. Diminui o tamanho das ligações comprimindo a molécula.

Efeito da Pressão

■ Interações Intermoleculares

- **Proteína-Proteína:** Dissociação de proteínas oligoméricas, fragmentação da molécula.
- **Enzima-Substrato:** A ocorrência de eletrostrição pode romper o par iônico entre substrato e enzima.

Efeito da Pressão

Interações moleculares

(1 bar)

- presence of cavities within protein

(0.5 ~ 2 kbar)

- dissociation of oligomer
- electrostriction
- clathrate formation around hydrophobic residues

(~ 5 kbar)

- conformational fluctuations provide pathways for water to penetrate into cavities
- shortening of hydrogen bonds (not in figure)
- swelling of hydrophobic core due to water

(5 ~ 10 kbar)

- formation of molten globule state
- disruption of tertiary structure
- loss of void spaces within protein

Termoestabilização Induzida por Pressão

- Pressão e Temperatura são forças opostas em termos de entropia.

Aumentando a temperatura leva a desordem enquanto que aumentando a pressão leva a ordem.

Porém, isso não é verdadeiro para todas as proteínas.

Termoestabilização Induzida por Pressão